

AVVERTENZE SPECIALI

Prima di utilizzare il prodotto su animali con gravi lesioni del padiglione interno dell'orecchio o del dotto, consultare il medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali
Evitare il contatto con gli occhi.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali - Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli - Come per tutti i trattamenti topici evitare di toccare la zona trattata finché non è completamente asciutta - Evitare il contatto con le mani o qualsiasi altra parte del corpo - Non ingerire né fare ingerire - In caso di ingestione accidentale consultare un medico - Dopo l'applicazione lavarsi le mani con acqua e sapone.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Nessuna conosciuta. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio

Non superare le dosi consigliate. In caso di eccessivo dosaggio, rimuovere con idoneo materiale assorbente (garza, cotone o altro) l'eccesso di liquido e se necessario consultare il medico veterinario.

Incompatibilità

Non note.

SOLO PER USO VETERINARIO

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Flacone da 25 ml - A.I.C. n° 103179026



SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

POSOLOGIA, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso auricolare. Lasciar cadere all'interno del padiglione dell'orecchio da 2 a 10 gocce di Aca Cerulen, a seconda della grandezza dell'animale, pari a circa Diclorofene 0,41 mg/kg p.a., Piperonil butossido 1,04 mg/kg p.a., Piretrine 0,1 mg/kg p.a..

L'interno del padiglione auricolare deve risultare uniformemente unto con il farmaco. Entrambe le orecchie vanno trattate, anche se solo un orecchio sembra essere colpito. Un leggero massaggio sulla parte esterna alla base dell'orecchio aiuta a smuovere il cerume. Asportare con cotone e strumenti adatti il cerume per quanto possibile. Infine ungere leggermente l'interno dell'orecchio con qualche goccia di Aca Cerulen.

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con abbondante acqua. Ripetere dopo qualche giorno se necessario. Se persistono segni di malattia consultare il proprio medico veterinario.

Il veterinario deve essere consultato immediatamente se il gatto o il cane presenta un profuso e nauseabondo scarico dall'orecchio, continua a graffiarsi, scuote o inclina la testa, o manifesta dolore. Inoltre consultare il veterinario se durante il trattamento la condizione peggiora o se il disagio persiste per più di 10 giorni.

TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

Teknofarma S.r.l. - Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - Torino

ACA CERULEN

gocce auricolari

CONFEZIONE

Flacone da 25 ml
con contagocce



INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 g di soluzione contengono:

principi attivi:

Diclorofene	g 1
Estratto di piretro al 25 % di piretrine	g 1
Piperonil butossido	g 2,5
eccipienti q.b. a	g 100

FORMA FARMACEUTICA

Gocce auricolari, soluzione.

INDICAZIONI Per il trattamento delle infestazioni da acari dell'orecchio degli animali domestici (cani, gatti).

CONTROINDICAZIONI Prima di utilizzare il medicinale veterinario esaminare accuratamente l'interno del padiglione e del canale auricolare. Se presenta lesioni gravi o se è noto che l'animale abbia il timpano perforato, consultare il medico veterinario.

Non usare in caso di ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE Il Diclorofene se ingerito in quantità superiore ai 100 mg/kg può indurre nausea, vomito, coliche gastro-intestinali e diarrea. Sono stati segnalati alcuni casi di arrossamento del padiglione interno dell'orecchio degli animali trattati. Segnalare al proprio medico veterinario prescrittore eventuali reazioni avverse gravi e/o reazioni non menzionate su questo astuccio.

Posologia



A 103179026

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO

Settembre 2020

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti - Aca Cerulen non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o altri organismi marini.