

ACA CERULEN "R" spray auricolare

per



Teknofarma

FORMA FARMACEUTICA Spray auricolare, soluzione. Senza gas propellente.

CONFEZIONE Flacone da 300 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE Conigli.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE Teknofarma S.r.l.

Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - TORINO

Flacone da 300 ml: A.I.C. n° 103166029

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO Settembre 2020

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 g di soluzione contengono: **principi attivi:**

Estratto di piretro al 25 % di piretrine g 1,2

Clorocresolo g 1,2

Piperonil butossido g 3,0

eccipienti q.b. a g 100

INDICAZIONI Per il trattamento delle infestazioni da acari (Sarcoptes e Psoroptes cunicoli) dell'orecchio del coniglio e la disinfezione delle lesioni.

CONTROINDICAZIONI Non somministrare in animali con ipersensibilità nota alle piretrine o agli altri principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non usare contemporaneamente con sostanze note per essere ototossiche.

Non trattare animali con perforazione della membrana timpanica o con alterazioni dell'orecchio medio anche se solo sospette. In questi casi consultare il Medico Veterinario.

REAZIONI AVVERSE Nessuna nota.

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE Per uso auricolare.

Agitare prima dell'uso. Premere a scatti sullo spruzzatore in modo da ottenere la fuoriuscita del getto nebulizzato. Dirigere il getto nel o sull'orecchio del coniglio e irrorare con una, due spruzzate per orecchio a seconda del peso dell'animale: per esempio per un coniglio di 2 kg di peso utilizzare una spruzzata/orecchio pari a una spruzzata/kg e pari a circa Clorocresolo 1,38 mg/kg p.a., Estratto di Piretro 1,38 mg/kg p.a. (Piretrine 0,35 mg/kg p.a.), Piperonilbutossido 3,45 mg/kg p.a..

Entrambe le orecchie vanno trattate, anche se solo un orecchio sembra essere colpito.

Ripetere dopo 4 - 5 giorni se necessario. Se il problema persiste rivolgersi ad un Medico Veterinario.

TEMPO DI ATTESA Carni e visceri: zero giorni.

AVVERTENZE SPECIALI Vedi anche "Controindicazioni".

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali - Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali. Non ingerire né fare ingerire.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi dell'operatore. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi con acqua e sapone.

Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze incandescenti.

Evitare di spruzzare su alimenti o bevande. Non ingerire né fare ingerire.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione Nessuna conosciuta. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio Si può verificare un lieve arrossamento della parte trattata.

Non superare le dosi consigliate.

Incompatibilità Non somministrare contemporaneamente ad altri prodotti otologici.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Prodotto infiammabile. Conservare a temperature comprese tra 16 e 30 °C e lontano da fonti di calore. Non usare dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti - Aca Cerulen R non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o altri organismi marini.



A103166029