

1. Denominazione del medicinale veterinario

Neo Erlen Spray

2. Composizione qualitativa e quantitativa

100 g di soluzione contengono:

Principi attivi:

- Dietiltoluamide	g	10
- Fenotrina	g	0,5
- Tetrametrina	g	0,5

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere § 6.1..

3. Forma farmaceutica

Spray cutaneo, soluzione.

Senza gas propellente.

4. Informazioni cliniche**4.1. Specie di destinazione**

Cani e gatti.

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione

Usare nel cane e nel gatto per la disinfestazione da parassiti (pulci, pidocchi, zecche e zanzare), sia su aree circoscritte infestate, sia per ricoprire tutto il mantello dell'animale con un velo di prodotto; in questo caso l'azione disinfestante e insettopellente perdura per una settimana.

4.3. Controindicazioni

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari – Non utilizzare il prodotto su animali malati o con estese lesioni della pelle, senza avere preventivamente consultato il Medico Veterinario.

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

L'azione antiparassitaria e repellente dura sette giorni se l'animale non viene lavato.

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali. Evitare l'applicazione nel condotto uditivo esterno.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - In caso di contatto con la pelle, lavarsi con acqua e sapone - Le persone sensibili dovrebbero evitare il contatto con il prodotto. Evitare di spruzzare su alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli.

Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze incandescenti.

4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna.

Segnalare eventuali reazioni avverse gravi e/o reazioni non menzionate in questo RCP.

4.7. Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

4.8. Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

4.9. Posologia e via di somministrazione**Flacone da 200 ml**

Per uso esterno.

Premere a scatti sullo spruzzatore in modo da ottenere la fuoriuscita del getto nebulizzato e spruzzare contro pelo sul mantello dell'animale ad una distanza di 20 cm.

Per il trattamento di tutta la superficie corporea sono necessari da 3 a 5 ml di soluzione per Kg di peso animale a seconda della lunghezza del pelo, corrispondenti a 30 – 50 spruzzate per Kg di peso.

Evitare di spruzzare una quantità eccessiva di prodotto in quanto è sufficiente, per una buona disinfestazione, che dopo il trattamento il mantello dell'animale risulti appena inumidito.

Il trattamento va ripetuto una volta alla settimana se persiste la possibilità di re-infestazione. Tutti i componenti hanno una notevole resistenza alla luce solare. L'azione antiparassitaria ha durata di circa 7 giorni se l'animale non viene lavato.

Flacone da 500 ml

Per uso esterno.

Premere a scatti sullo spruzzatore, dopo aver aperto la valvola erogatrice, e spruzzare contro pelo sul mantello dell'animale ad una distanza di 20 cm.

Per il trattamento di tutta la superficie corporea sono necessari da 3 a 5 ml di soluzione per Kg di peso animale a seconda della lunghezza del pelo, corrispondenti a 3 – 4 spruzzate per Kg di peso.

Evitare di spruzzare una quantità eccessiva di prodotto in quanto è sufficiente, per una buona disinfestazione, che dopo il trattamento il mantello dell'animale risulti appena inumidito.

Il trattamento va ripetuto una volta alla settimana se persiste la possibilità di re-infestazione. Tutti i componenti hanno una notevole resistenza alla luce solare. L'azione antiparassitaria ha durata di circa 7 giorni se l'animale non viene lavato.

4.10. Sovradosaggio

Non usare in quantità eccessiva ed impropria. In caso di eccessivo dosaggio lavare l'animale con uno shampoo di pulizia e consultare il medico veterinario.

4.11 Tempo d'attesa

Non pertinente.

5. Proprietà farmacologiche

ATC: QP53A – Ectoparassitici per uso topico inclusi gli insetticidi.

5.1. Proprietà farmacodinamiche

Disinfestante, insettopellente, per il trattamento degli ectoparassiti del cane e del gatto (pulci, pidocchi, zecche, zanzare).

La Tetrametrina esercita un'azione abbattente completata dall'azione insetticida della Fenotrina.

Entrambi i principi attivi esercitano anche un'azione insettopellente completata dalla Dietiltoluamide, per impedire che i parassiti aggrediscano gli animali.

Il prodotto risulta utile nella prevenzione delle gravi parassitosi frequentemente trasmesse con le punture di insetti.

5.2. Informazioni farmacocinetiche

Non pertinente.

5.3. Proprietà ambientali

Non pertinente.

6. Informazioni farmaceutiche**6.1. Elenco degli eccipienti**

Alcool isopropilico

Acqua depurata

6.2. Incompatibilità

Non note.

6.3. Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare lontano da fonti di calore e a temperatura non superiore ai 25 °C.

Prodotto infiammabile.

6.5. Natura e composizione del condizionamento primario**Confezione da 200 ml**

Flaconi soffiati in polietilene ad alta densità, contenenti 200 ml di soluzione; la bocca è adatta alla chiusura con ghiera di alluminio aggraffabili fornite di pompeta per l'erogazione.

Confezione da 500 ml

Flaconi soffiati in polietilene contenenti 500 ml di soluzione; la bocca a vite è adatta alla chiusura con pompe a pistola, munita di tappo a vite, guarnizione e pescante.

Astuccio esterno in cartone.

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso - Non contaminare i corsi d'acqua.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

TEKNOFARMA S.r.l., con sede legale e stabilimento siti in Torino, Strada Comunale da Bertolla alla Abbazia di Stura, 14.

8. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Flacone da 200 ml: A.I.C. n° 103177010

Flacone da 500 ml: A.I.C. n° 103177022

9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione

Data della prima autorizzazione come Presidio Medico Chirurgico:
17/04/1990.

Data del Decreto di autorizzazione come Specialità Medicinale:
22/12/2000.

10. Data di revisione del testo

Novembre 2020

Divieto di vendita, fornitura e/o impiego

Non pertinente.

Modalità di dispensazione

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.