

STIEN


PET LINE

Mangime complementare per cani e gatti

**PER L'INTEGRAZIONE DELLA DIETA DEI CANI
E DEI GATTI AFFETTI DA STRUVITE
COADIUVANTE LA RIDUZIONE DEL PH URINARIO**



Teknofarma



Stien Pet Line può essere somministrato fino a sei mesi o secondo necessità.

La quantità giornaliera e il periodo di impiego possono essere modificati a giudizio del Medico Veterinario.

Urolitiasi da STRUVITE


I calcoli di struvite sono composti da **ammonio magnesio fosfato esaidrato** e si formano quando un aumento del pH urinario a **valori superiori a 6,5** causa la precipitazione sotto forma di struvite degli ioni magnesio, ammonio e fosfato.

L'acidificazione dell'urina aumenta la solubilità dei cristalli di struvite



Valori di pH delle urine compresi tra 6,0-6,5 sono normalmente sufficienti a impedire la formazione di cristalli di struvite o il verificarsi di recidive.

Associazione di METIONINA e AMMONIO CLORURO



Rispetto all'utilizzo dei due componenti usati singolarmente, l'associazione **METIONINA + AMMONIO CLORURO** consente di:

- ottenere una **più rapida ed efficace acidificazione del pH urinario**
- mantenere tale pH urinario **stabile nel tempo**
- evitare pericolose fluttuazioni con picchi alcalini che porterebbero a valori di pH superiori a quelli di partenza

Ingrandimento del cristallo



Cause predisponenti la formazione

- Sovrasaturazione dell'urina da parte degli ioni magnesio, ammonio e fosfato
- UTI sostenuta da batteri ureasi-produttori (soprattutto nel cane)
- Urina alcalina
- Cause dietetiche
- Predisposizione genetica

Razze predisposte CANI GATTI

- | | |
|--------------------------|--|
| - Shih Tzu | Tutti i soggetti possono presentare la Struvite, ma è più frequente nei soggetti di razza pura |
| - Schnauzer Nano | |
| - Barbone nano | |
| - Bichon frisé | |
| - Lhasa Apso | |
| - Cocker Spaniel Inglese | |



- Sovrasaturazione dell'urina da parte di calcio e ossalato
- Iperassorbimento intestinale di calcio
- Cause dietetiche
- Intossicazione da glicole etilenico (cristalli di ossalato di calcio monoidrato)

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Shih Tzu | - Birmano |
| - Schnauzer Nano | - Persiano |
| - Barbone nano | - Himalayano |
| - Bichon frisé | |
| - Lhasa Apso | |
| - Yorkshire Terrier | |




- Difetto geneticamente ereditario nel metabolismo dell'acido urico
- Disfunzioni epatiche (es. shunt portosistemico)
- Elevati livelli di purina nella dieta
- Acidità urinaria

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Dalmata | - Siamese |
| - Bulldog Inglese | |
| - Schnauzer Nano | |
| - Yorkshire Terrier | |



Cistinuria dovuta ad un difetto nel riassorbimento tubulare della cistina

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Bulldog Inglese | Estremamente rari |
| - Bassotto | |
| - Basset Hound | |
| - Yorkshire Terrier | |





STIEN PET LINE per gatti e cani di piccola taglia

**FORMULAZIONE AD ELEVATA APPETIBILITÀ
PER I GATTI E I CANI PIÙ ESIGENTI**

- Compresse altamente appetibili, grazie alla presenza di **proteine di pollo di elevata qualità**
- **1 compressa / kg p.a. al giorno**, durante o subito dopo i pasti
- Confezione da **80 compresse** divisibili e blisterate



STIEN PET LINE per cani di media e grande taglia

**ADATTO ANCHE AI SOGGETTI ALLERGICI
ALLE PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE**

- Formulazione in compresse appetibili contenenti come aromatizzanti esclusivamente **idrolizzati proteici di elevata qualità di origine suina, non allergenici** (peso molecolare medio < 1000 Dalton), studiata per rispondere alle specifiche esigenze dei soggetti con RAC (Reazioni Avverse al Cibo)
- La quantità giornaliera da somministrare, durante o subito dopo i pasti, in base al peso animale è indicata in tabella:

kg p.a.	N° compresse / giorno						
1	⊕	6	⊕ ⊕	11-14	⊕ x 3	35-39	⊕ x 8
2	⊕	7	⊕ ⊕	15-19	⊕ x 4	40-44	⊕ x 9
3	⊕	8	⊕ ⊕	20-24	⊕ x 5	45-49	⊕ x 10
4	⊕	9	⊕ ⊕ ⊕	25-29	⊕ x 6	50-59	⊕ x 11
5	⊕ ⊕	10	⊕ ⊕ ⊕	30-34	⊕ x 7	60-70	⊕ x 12

- Confezione da **48 compresse** divisibili e blisterate

- Le compresse possono essere somministrate direttamente o sminuzzate e aggiunte al cibo
- Se l'animale mangia due volte al giorno, suddividere il numero di compresse tra i due pasti
- La quantità giornaliera e il periodo di impiego possono essere modificati a giudizio del Medico Veterinario
- **Durante l'assunzione di Stien Pet Line si suggerisce di eseguire periodicamente un esame delle urine completo o comunque il controllo del pH urinario**

Teknofarma

Torino - Tel.: 011 2731702

teknofarma@teknofarma.com - www.teknofarma.com



SCOPRI DI PIÙ