

COMPOSIZIONE Ogni g contiene: **stanzoni attive:** Clorocresolo mg 12, Piperonil butossido mg 30. Soluzione limpida, colore giallo paglierino, odore caratteristico.

INDICAZIONI PER L'USO Per il trattamento delle infestazioni da acari (*Sarcoptes* e *Psoroptes cuniculi*) dell'orecchio del coniglio e la disinfezione delle lesioni.

CONTROINDICAZIONI Non usare in caso di ipersensibilità nota alle piretrine o alle altre sostanze attive o a uno degli eccipienti. Non usare contemporaneamente con sostanze note per essere ototossiche. Non trattare animali con perforazione della membrana timpanica o con alterazioni dell'orecchio medio anche se solo sospette. In questi casi consultare il medico veterinario.

AVVERTENZE SPECIALI Avvertenze speciali: Vedere anche "Controindicazioni". L'uso non necessario di antiparassitari o un uso che si discosta dalle indicazioni fornite può aumentare la pressione di selezione della resistenza e portare a una ridotta efficacia. Deve essere presa in considerazione la possibilità che altri animali nello stesso ambiente possano essere infestati da acari dell'orecchio, pertanto consultare un medico veterinario per valutare la necessità di trattare con lo stesso medicinale veterinario anche questi soggetti.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali. Non ingerire né fare ingerire. **Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi dell'operatore. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi con acqua e sapone. Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze incandescenti. Evitare di spruzzare su alimenti o bevande. Non ingerire né fare ingerire. **Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:** Le sostanze attive del prodotto medicinale (piretrine) sono tossiche per i pesci, per altri organismi acquatici e per le api mellifere; pertanto si raccomanda di non contaminare l'ambiente e i corsi d'acqua con il prodotto o con i flaconi vuoti. **Gravidanza e allattamento:** Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento. **Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:** Nessuna nota. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari ed altri prodotti ologici, inclusi prodotti per la pulizia e l'igiene auricolare. **Sovradosaggio:** Si può verificare un lieve arrossamento della parte trattata. Non superare le dosi consigliate.

TEMPI DI ATTESA Carni e frattaglie: zero giorni.

Lot
Exp.



Aca Cerulen R

spray auricolare,
soluzione



Teknofarma

CONFEZIONE 300 ml.

SOLO PER USO VETERINARIO

CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

RECAPITI Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, fabbricante responsabile del rilascio dei lotti e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi

Teknofarma S.r.l. - Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 - Torino - Italia. Tel: +39 (0)11 2731702
E-mail: farmacovigilanza@teknofarma.com

A.I.C. n° 103166029



A103166029

POSIZIONE PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE Per uso auricolare. Una o due spruzzate per orecchio a seconda del peso dell'animale e del grado di infestazione: per esempio per un coniglio di 2 kg di peso corporeo utilizzare una spruzzata/orecchio pari a una spruzzata/kg p.c. e pari a circa Clorocresolo 1,38 mg/kg p.c., Estratto di Piretro 1,38 mg/kg p.c. (Piretrine 0,35 mg/kg p.c.), Piperonil butossido 3,45 mg/kg p.c.. Vanno trattate entrambe le orecchie, anche se solo un orecchio sembra essere colpito. Ripetere dopo 4 - 5 giorni se necessario. Se il problema persiste rivolgersi ad un medico veterinario. L'eventuale necessità di ripetere il trattamento dovrebbe essere valutata dal medico veterinario in base alla valutazione della situazione epidemiologica ambientale e dello stile di vita dell'animale.

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE Agitare prima dell'uso. Premere a scatti sullo spruzzatore in modo da ottenere la fuoriuscita del getto nebulizzato, quindi dirigere il getto nel o sull'orecchio del coniglio.

EVENTI AVVERSI Coniglio: Nessuno noto. La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questa etichetta, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati in questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione:

<https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Prodotto infiammabile. Conservare a temperature comprese tra 16 e 30°C e lontano da fonti di calore. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta dopo Exp.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Questo medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente. Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DELL'ETICHETTA 12/2025. Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella Banca dati dei medicinali dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).